

Lemure catta

Distribuzione

Il Lemure catta è distribuito nelle foreste e nelle boscaglie del Madagascar, mostrando una forte preferenza per le foreste a galleria e per i boschi di Euphorbia. Generalmente risulta meno incline a vivere sugli alberi, rispetto alle altre specie di lemuri.

Riproduzione

Il lemure catta è un primate con sistema nuziale poliginico in quanto, anche se in un gruppo sono presenti più individui dei due sessi, solo il maschio dominante si accoppia con le femmine. La femmina risulta sessualmente recettiva per soli 1-2 giorni all'anno e partorisce in genere un solo piccolo dopo un periodo di gestazione che va dai 135 ai 145 giorni. Lo svezzamento avviene attorno alle 8 settimane. La maturità sessuale in questi lemuri viene raggiunta fra i 2 e i 3 anni di età, ma condizioni ambientali ottimali possono velocizzare il processo.

Status di conservazione

Il suo habitat tende sempre più a ridursi in seguito alla creazione di nuovi terreni adibiti al pascolo, ottenuti tramite l'incendio delle aree forestali, e all'abbattimento degli alberi per la produzione di carbone. Le principali minacce per la specie sono la perdita d'habitat e la caccia.

La densità della popolazione è in genere bassa e avendo subito un decremento del 20-25% negli ultimi 24 anni.

Negli zoo è specie molto comune, e si riproduce con estrema facilità.



Nome Scientifico	Lemur catta
Classe	Mammiferi
Ordine	Primati
Famiglia	Lemuridi
Dieta	Frutta, foglie, altre parti di piante, a volte insetti



La Lista Rossa dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) fornisce informazioni sullo stato di conservazione a livello globale di animali e piante. Il diverso grado di rischio di estinzione è rappresentato dalle categorie entro le quali vengono inserite le specie.

Fonte: www.iucnredlist.org