

Lichi del Nilo

Distribuzione

È originaria delle aree alluvionali del Sudan meridionale dove vive in gruppi sociali da 50 a 500 individui, in aree palustri; si nutrono di piante acquatiche.



All'interno del branco si formano 3 classi sociali: le femmine che allattano i loro piccoli, i giovani maschi e i maschi maturi che difendono il loro territorio.

Notevole è il dimorfismo sessuale: le femmine sono bruno-dorate con il ventre bianco e sono prive di corna mentre i maschi variano dal bruno cioccolato al marrone, con un «cappuccio» bianco sul garrese e piccole macchie bianche sugli occhi; inoltre hanno lunghe corna strutturate a cresta. I giovani maschi sono molto simili alle femmine adulte fino ai 2-3 anni di età. I giovani diventano indipendenti dalla madre tra i 6 e gli 8 mesi di età. I predatori naturali dei Lichi del Nilo sono i Leoni, i Leopardi, i Licaoni e i Coccodrilli.

Riproduzione

Durante la stagione degli amori i giovani maschi rivolgono le corna verso il suolo ed urinano sui lunghi peli della gola e del petto. I maschi combattono nell'acqua, immergendo le loro teste in combattimenti corna a corna. Queste contese sono solitamente brevi e violente. Le femmine sono abbastanza rumorose e mentre si spostano emettono un gracido simile a quello di un rospo.

Status di conservazione

È una specie ad elevato rischio di estinzione. La degradazione dell'habitat da parte dell'uomo e il bracconaggio rappresentano la minaccia più grande per questa specie.



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Nome Scientifico | Cobus megaceros |
| Classe | Mammiferi |
| Ordine | Artiodattili |
| Famiglia | Bovidae (Reduncinae) |
| Dieta | Erbivora |



La Lista Rossa dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) fornisce informazioni sullo stato di conservazione a livello globale di animali e piante. Il diverso grado di rischio di estinzione è rappresentato dalle categorie entro le quali vengono inserite le specie.

Fonte: www.iucnredlist.org